



VOUS CROYEZ AVOIR SUBI UN TEST DE DÉPISTAGE DU CANCER FÉMININ LE PLUS MORTEL? DÉTROMPEZ-VOUS.

IL N'EXISTE AUCUN TEST DE DÉPISTAGE FIABLE DU CANCER DE L'OVAIRE
ET AUCUN VACCIN POUR PRÉVENIR CETTE MALADIE.

VOICI CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR

Toutes les femmes courent le risque de développer le cancer de l'ovaire. Mais une femme court un risque plus élevé si :

- Elle a plus de 50 ans
- Elle a des antécédents familiaux de cancer de l'ovaire, de cancer du sein, de cancer de l'endomètre (utérus) ou de cancer colorectal
- Elle est d'origine juive ashkénaze
- Elle est porteuse d'une mutation génétique associée au cancer de l'ovaire

Les facteurs suivants réduisent le risque de cancer de l'ovaire :

- Prise de contraceptifs oraux
- Grossesse menée à terme
- Ligature des trompes
- Ablation chirurgicale des trompes de Fallope et des ovaires

VOICI CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

Parlez à votre médecin de vos risques de développer le cancer de l'ovaire afin de déterminer si vous devriez prendre des mesures préventives.

LE CANCER DE L'OVAIRE EST DIFFICILE À DÉPISTER

Il peut facilement passer inaperçu parce que ses symptômes peuvent signaler plusieurs problèmes de santé. Les symptômes les plus courants comprennent :

- Les ballonnements
- L'inconfort abdominal
- La difficulté à manger
- Les changements d'habitudes urinaires

Parlez-en à votre médecin si vous éprouvez des symptômes nouveaux qui persistent pendant trois semaines ou plus. Si un cancer de l'ovaire est soupçonné, vous devriez consulter un gynécologue-oncologue pour obtenir des soins spécialisés.

Pour de plus amples renseignements, visitez
ovairecanada.org

